

	Grade				
	1	2	3	4	5
食欲低下	食生活の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない食欲低下; 経口栄養剤による補充を要する	顕著な体重減少または栄養失調を伴う; 点滴/経管栄養を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分; 点滴/経管栄養、入院を要する	—	—
嘔吐	治療を要さない	外来での輸液を要する; 内科的治療を要する	高カロリー輸液/経管栄養、入院を要する	生命を脅かす	死亡
下痢	普段と比べて1日4回未満の排便回数増加; 普段と比べて人工肛門からの排泄量が軽度増加	普段と比べて1日4~6回の排便回数増加; 普段と比べて人工肛門からの排泄量が中等度増加; 下痢により身の回り以外の日常生活動作が制限される	普段と比べて1日7回以上の排便回数増加; 入院を要する; 普段と比べて人工肛門からの排泄量が高度に増加; 下痢により日常生活動作が制限される	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡
便秘	不定期または間欠的な症状; 便軟化剤、緩下剤、食事の工夫を要する; 浣腸を不定期に使用する	緩下剤または浣腸の定期的使用を要する持続的状況; 便秘により身の回り以外の日常生活が制限される	排便を要する頑固な便秘; 便秘により身の回りの日常生活が制限される	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡
疲労感	休息により軽快する疲労	休息により軽快しない疲労; 疲労により身の回り以外の日常生活動作が制限される	休息によって軽快しない疲労; 疲労により身の回りの日常生活動作が制限される	—	—
しびれ	治療を要さない軽度のしびれ	中等度の症状がある; しびれにより身の回り以外の日常生活動作が制限される	高度の症状がある; しびれにより身の回りの日常生活動作が制限される	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡
口内炎	症状がない、または軽度の症状がある; 治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍; 食事の変更を要する	高度の疼痛がある; 経口摂取に支障がある	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡
発熱	38~39°C	39~40°C	40°Cを超えるが24時間は持続しない	40°Cを超える状態が24時間以上持続する	死亡
四肢の浮腫	腫脹していることが注意深くみるとわかる	腫脹していることが容易にわかる; 皮膚のしわの消失; 浮腫により身の回り以外の日常生活が制限される	腫脹が著明である; 浮腫により身の回りの生活動作が制限される	—	—
手足症候群	疼痛を伴わないわずかな皮膚の変化または皮膚炎(紅斑、浮腫、角質増殖)	疼痛を伴う皮膚の変化(角層剥離、水疱、亀裂、出血); 症状により身の回り以外の日常生活動作が制限される	疼痛を伴う高度の皮膚の変化; 症状により日常生活動作が制限される	—	—